

Официальный дистрибьютор ДЭНАС МС

<http://denas-shop.com/>

Показания, дозировка и способ применения природной натуральной Карловарской соли при различных заболеваниях.

| Заболевание | Концентрация раствора КВС. Температура воды | Объем ежедневной дозы. Время приема перед едой | Способ приема | Курс. Особенности |
|--|---|---|--|--|
| Хронический гастрит с пониженной или практически нулевой желудочной секрецией | концентрация: 0,5% температура: 60 °С | Утром: 300 мл на голодный желудок Обед: 200 мл Ужин: 200-300 мл За 20-30 мин до еды | Маленькими глотками, медленно | Принимать в течение не менее 3-х недель. Можно повторять 2-3 раза в год |
| Хронический гастрит с нормальной желудочной секрецией | концентрация: 0,5% температура: 30 °С | Утром: 100-400 мл на голодный желудок Обед: 200 мл Ужин: 100-400 мл За 45 мин до еды | Медленно, маленькими глотками в течение 3-4 х недель. Можно 2 раза в год | Принимать в течение 3-4-х недель. можно повторять 2 раза в год |
| Хронический гастрит с повышенной желудочной секрецией | концентрация: 0,5% или 1% температура: 45 °С или 60 °С | Утром: 200-400 мл на голодный желудок Обед: 200 мл Ужин: 200-400 мл Перед сном: 200 мл За 45-60 мин до еды и перед сном | Быстро, большими глотками. Четыре приема в день | Принимать в течение 4-6-ти недель. Затем длительной время утром на голодный желудок или перед сном 100-200 мл. |
| Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки во время ремиссии или вне обострения | концентрация: 0,5% температура: 45 °С | 3 раза в день по 200 мл: за 35-60 мин до еды | Маленькими глотками, медленно, с перерывом между чашками 10-15 мин | Принимать в течение 4-6 недель. Затем длительное время утром на голодный желудок или перед сном 100-200 мл |
| Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, вне | концентрация: 0,5% температура: | Сначала 5-6 раз в день по 100 мл, в дальнейшем 3-4 | Небольшими глотками, в лежачем | Принимать в течение 4-6 недель. Затем |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| обострения | начиная с 30 °С, в дальнейшем 45 °С | раза в день Перед едой и во время еды | положении | длительное время утром на голодный желудок или перед сном 100-200 мл. Можно повторять 2 раза в год |
| Состояние после резекции желудка | концентрация: 0,5% температура: начиная с 45 °С, в дальнейшем 30 °С | Утром: 300 мл на голодный желудок Обед: 200 мл Ужин: 100-200-300 мл За 20-30 мин до еды | Маленькими глотками, медленно, начиная с маленьких ежедневных доз | Принимать в течение 4-6 недель. Повторять 2 раза в год |
| Хронический колит с повышенной двигательной функцией кишечника (понос) | концентрация: 0,5% температура: 60 °С | Сначала 4 раза в день по 100 мл, при улучшении стула - утром на голодный желудок 300 мл, в дальнейшем - по 200 мл 1-3 раза в день в зависимости от состояния стула. За 35-60 до еды | Медленно, небольшими глотками | Принимать в течение 3-6 недель |
| Хронический колит с пониженной активностью кишечника (запор) | концентрация: 1% или 2% температура: 30 °С (при атонии кишечника) или 60 °С (при спазмах кишечника) | 4 раза в день по 400 мл За 45 мин до еды | Медленно, небольшими глотками | Принимать 3-5 недель. Затем длительное время по 200-600 мл 0,5-1,0% раствора при 30 °С утром натощак |
| Дискенезия желчевыводящих путей и хронический холецистит | концентрация: 1% температура: 45 °С | Вначале: Утро: 400 мл на голодный желудок Обед: 200 мл Ужин: 400 мл. Затем плавно увеличить до: Утро: 600 мл на голодный желудок Обед: 200-300 мл Ужин: 600 мл Время приема: до | Медленно, небольшими глотками с перерывом между чашками 10-15 мин | Принимать в течение 3-6 недель. Во время приема раствора рекомендуется прогулка. После окончания курса с целью профилактики пить утром натощак 200-400мл 1% раствора при 30 °С долгое время |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | еды зависит от состояния желудочной секреции | | |
| Состояние после холецистэктомии | концентрация: 1% температура: 45 °С | В начале 3 раза в день по 200 мл, затем можно увеличивать отдельные дозы на 300-400 мл. За 45 мин до еды | Медленно, небольшими глотками | Принимать в течение 3-4 недель |
| Хронический гепатит и цирроз печени вне обострения | концентрация: 0,5% температура: 45 °С | В начале 3 раза в день по 100 мл, позже плавно увеличивать дозу до 200 мл. За 45 мин до еды | Маленькими глотками, медленно | Принимать 3-6 недель. Утреннюю дозу пить в постели, наложить компресс на область печени. Курс повторить через 6 мес. |
| Хронический рецидивирующий панкреатит | концентрация: 1% температура: 45 °С (при поносах - 60 °С) | Вначале 3 раза в день по 100-200 мл. Затем при хорошей переносимости и укреплении стула дозу плавно увеличить до: Утром 400 мл на голодный желудок Обед: 200 мл Ужин: 400 мл. Натошак | Маленькими глотками: первую чашку следует пить в течение 3 мин, последующие в течение 5 мин. Перерыв между чашками 10-15 мин | Принимать 3-6 недель. Затем длговременно продолжать принятие 200-400 мл 1% раствора утром натошак. |
| Мочекаменная болезнь. Профилактика аммониевых камней. Хроническое воспаление мочевыводящих путей. | концентрация: 0,5% температура: 30-45 °С | Вначале принимать 750-1250 мл в день, затем увеличивать дозу более 1250 мл. Утро: 400-600 мл на голодный желудок. Остальную дозу равномерно в течение дня. Последний прием вечером перед сном. С учетом существующих | Маленькими глотками медленно | Принимать по 3-5 недель два раза в год. Необходимо строгое соблюдение рекомендаций врача-специалиста. |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | заболеваний пищеварительной системы | | |
| Сахарный диабет, гиперлиппротеинемия, подагра | концентрация: 0,5%-1% температура: 45 °С | Вначале: Утро: 200-400 мл на голодный желудок Обед: 200 мл Ужин: 400 мл. затем плавно увеличить суточную дозу до 1300-1400 мл Время принятия до еды, зависит от состояния желудочной секреции | Маленькими глотками медленно | Принимать по 3-5 недель два раза в год. Необходимо строгое соблюдение рекомендаций врача- специалиста. |
| Стоматологические, проктологические, гинекологические проблемы | концентрация: 0,5% температура: назначает врач | Полоскания полости рта, клизмы, и спринцевания. Назначает врач | Назначает врач | Назначает врач |
| Острые респираторные заболевания, грипп | концентрация: 0,5% температура: От 30 °С до 45 °С | Внутренний прием. В течение дня 400-600 мл. Ингаляции 1-2 раза в день | Маленькими глотками, медленно, можно добавлять в теплое молоко | По необходимости при наличии противопоказаний к приему внутрь, возможно заменить на ингаляции. |
| Косметические цели | концентрация: 0,5%-2,0% температура: замороженные кубики или раствор 15-18 °С | По необходимости. Назначает врач | Легкий массаж кожи | По необходимости |

Официальный дистрибьютор ДЭНАС МС

<http://denas-shop.com/>